Чума по дребните преживни животни

Болестта



Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване по овцете и козите, което се характеризира с треска, депресия, изтечения от очите, носа и устата, афти в устната кухина, суха и напукана муцуна и ноздри и диария. Заразените животни могат да показват кашлица и затруднено дишане и хранене. Протичането на болестта може да завърши със смърт.

Начин на заразяване



Основният начин за предаване и разпространение на болестта е директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекцията.

Предпазване



Предпазване на стадото от проникване на болестта е най-добрият и най-евтиният начин за борба с нея . За да предпазите стадото си:

Избягвайте:
- Контактите между животни от различни стада(например на пасища);
- Посещения на други животновъдни обекти;
- Размяна и споделяне на животни, инструменти,превозни средства с други ферми.

Използвайте:
- Дезинфекционна площадка на входа на фермата;
- Предпазни облекла и калцуни за посетителите;
- Карантинни помещения, в които да изолирате и наблюдавате новозакупени животни в рамките на 21дни от влизането им във фермата

Информираност

Телефони за контакт:
Горещ телефон на БАБХ: 0700 12 299
02 915 98 89 AHW@bfsa.bg

Българска агенция по безопастност на храните

Вашето стадо може да бъде изложено на риск. Ето защо е от изключителна важност да проверявате редовно всички животни от Вашето стадо. Всяко съмнение за Чума по дребните преживни животни, трябва незабавно да се съобщава на ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за ограничаване на по нататъшното й разпространение .

eufmd european commission for the control of foot-and-mouth disease

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Шарка по овцете и козите

Болестта







Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, депресия, генерализиран изрив от папули по кожата и множествени пневмонични огнища в белите дробове.

Изривите по кожата започват с червени петна и папули, преминаващи в черни кръгли крусти и открити рани. Кожните лезии са лесно видими по главата и обезкосмените части на тялото (коремната област, основата на опашката, вимето, гениталите, вътрешните части на крайниците). Главата обикновено изглежда оголемена и деформирана. Протичането на болестта може да завърши със смърт.

Начин на заразяване



Основният начин за предаване и разпространение на болестта е директен контакт между здрави и болни животни. Контоминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекцията.

Предпазване



Предпазване на стадото от проникване на болестта е най-добрият и най-евтиният начин за борба с нея. За да предпазите стадото си:

Избягвайте:

- Контактите между животни от различни стада(например на пасища);
- Посещения на други животновъдни обекти;
- Размяна и споделяне на животни, инструменти, превозни средства с други ферми.

Използвайте:

- Дезинфекционна площадка на входа на фермата;
- Предпазни облекла и калцуни за посетителите;
- Карантинни помещения, в които да изолирате инаблюдавате

новозакупени животни в рамките на 21 дни от влизането им във фермата.

Информираност

Телефони за контакт:

Горещ телефон на БАБХ: 0700 12 299

02 915 98 89 AHW@bfsa.bg

Българска агенция по безопастност на храните

Вашето стадо може да бъде изложено на риск. Ето защо е от изключителна важност да проверявате редовно всички животни от Вашето стадо. Всяко съмнение за Шарка по дребните преживни животни, трябва незабавно да се съобщава на ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за ограничаване на по нататъшното й разпространение

eufmd european commission for the control of foot-and-mouth disease

Food and Agriculture Organization of the United Nations